


Binnen het Rijnlands Revalidatie Centrum doen we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om het revalidatieprogramma te evalueren en te verbeteren. Zodat wat wij doen echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt.



Zorgpad revalidatie na reanimatie


Ervaren kwaliteit van leven bij start van de revalidatie



Vier weken na reanimatie start de revalidatiebehandeling voor patiënten die succesvol gereanimeerd zijn na een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Bij de start van revalidatie onderzoekt het RRC onder andere de ervaren kwaliteit van leven en cognitief functioneren van de patiënt. Cognitief functioneren geeft aan in hoeverre je in staat bent om kennis en informatie op te nemen en te verwerken.

23% van de patiënten blijkt cognitieve problemen te hebben. De ervaren kwaliteit van leven verschilt op een aantal levensgebieden significant tussen patiënten die wel en die geen cognitieve problemen hebben.

ERVAREN KWALITEIT VAN LEVEN



PATIËNTEN ZONDER COGNITIEVE PROBLEMEN

59



PATIËNTEN MET COGNITIEVE PROBLEMEN

18

Wat betekent dit?

Patiënten met cognitieve problemen na reanimatie ervaren minder kwaliteit van leven. Het RRC biedt deze patiënten daarom een specifieke revalidatietraject waarin naast hartrevalidatie ook neurorevalidatie is opgenomen.

Onderzoek gepubliceerd in 2015 - uitgevoerd onder 77 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar.
Publicatie: Boyce-van der Wal, L. W., Volker, W. G., Vliet Vlieland, T. P. M., van den Heuvel, D. M. J., van Exel, H., & Goossens, P. H. (2015). Cognitive problems in patients in a cardiac rehabilitation program after an out-of-hospital cardiac arrest. *Resuscitation*, 93, 63–68. doi:10.1016/j.resuscitation.2015.05.029